

DÍNÓK

SEGÉDANYAG VICTOR ANDRÁS: PIRINYÓ SÁRKÁNYOK CÍMŰ CIKKÉHEZ
SZITAKÖTŐ 34. SZÁM, 30-32. OLDAL

TYRANNOSAURUS REX



SAUROPOSEIDON



©Masato Hattori

STEGOSAURUS



PROTOCERATOPS




PSITTACOSAURUS



EORAPTOR



GRACILICERATOPS



VELOCIRAPTOR



ARCHEOPTERYX



MICRORAPTOR



KOMODÓI SÁRKÁNY



Hüllők:

- ▶ Gerincesek
- ▶ Testfelépítés: fej, törzs, végtagok (4 láb), farok
- ▶ Kültakaró: pikkelyes bőr
- ▶ Szaporodás: lágy héjú tojással, amik a madarakkal ellentétben nem testük melegétől kelnek ki, hanem a napsugarakból származó hő segítségével
- ▶ Hidegvérűek, azaz testhőmérsékletük nem állandó, hanem a környezet hőmérsékletének hatására változik: hidegben lehűl – innen származik magyar elnevezésük – melegben felmelegszik
- ▶ Elterjedésük: az Antarktisz kivételével minden kontinensen megtalálhatók
- ▶ Négy nagy csoportba sorolhatók: 1. teknősök 2. krokodilok 3. felemásgyíkok 4. pikkelyes hüllők (kígyók, gyíkok)

Készítette: Jenei Beáta
Debrecen, Huszár Gál Iskola
Képek: internet

